

**YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM
DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN
SEVİYE TESPİT SINAVI
TIP DOKTORLUĞU
2. AŞAMA
16 MAYIS 2010**



ADI :
SOYADI :
T. C. KİMLİK / Y. U. NUMARASI :
SALON NUMARASI :

GENEL AÇIKLAMA

1. Bu testte 100 soru vardır.
1.-30. sorular: İç Hastalıkları
31.-60. sorular: Pediatri
61.-85. sorular: Cerrahi
86.-100. sorular: Kadın Hastalıkları ve Doğum
2. Bu test için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat).
3. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yerini işaretlemeyiniz.
4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz.
5. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak bir silgiyle cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
8. Bu sınavdaki sorulara verdiğiniz cevaplar puanlanırken her doğru cevaba bir puan verilecek, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir.
9. Soru kitapçığınızın sayfalarında uygun gördüğünüz boşlukları müsvetde için kullanabilirsiniz.
10. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2. AŞAMA

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

2010 – STS 2. Aşama / Tıp

- Aşağıdaki hastalıkların hangisinde 2-D transtoraksik ekokardiyografi yöntemi kesin tanı koydurucudur?**
 - Sol atrial miksoma
 - Koroner arter hastalığı
 - Hipertansiyon
 - Konstriktif perikardit
 - Restriktif kardiyomiopati
- Bir gebede, aşağıdaki bulgulardan hangisi bir kalp hastalığını düşündürmelidir?**
 - Birinci kalp sesinin şiddetlenmesi
 - Kapiller nabız bulunması
 - Üçüncü kalp sesinin duyulması
 - Diastolik üfürüm duyulması
 - Diastolik kan basıncının düşmesi
- Kalp yetmezliği sırasında, sol ventrikülün dolma basıncındaki (preload) artışa bağlı akciğer konjesyonu olması durumunda afterload'u etkilemeden uygulanabilecek en uygun vazodilatör aşağıdaki-lerden hangisidir?**
 - Hidralazin
 - Prazosin
 - Nifedipin
 - Kaptopril
 - Nitratlar
- Aşağıdaki hastalıkların hangisinde difüzyon kapasitesi (DL_{CO}) artar?**
 - İdyopatik pulmoner fibrozis
 - Amfizem
 - Tekrarlayan pulmoner tromboemboli
 - Primer pulmoner hipertansiyon
 - Alveolar hemoraji
- Aşağıdaki hastalıkların hangisinde restriktif tipte solunum fonksiyonu bozukluğu gözlenir?**
 - Astım
 - Kistik fibrozis
 - Bronşiektazi
 - Myastenia gravis
 - Bronşiolit
- β₂-agonist ilaçlar aşağıdaki enzimlerden hangisinin indüksiyonu ile etkili olur?**
 - Fosfodiesteraz
 - Adenilil siklaz
 - Fosfolipaz A
 - 5-lipoksijenaz
 - Siklooksijenaz

Diğer sayfaya geçiniz.

7. Aşağıdakilerden hangisi glomerüler filtrasyon değerinde azalmaya neden olmaz?

- A) Glomerüler kapillerlerde hidrostatik basınçta azalma
- B) Bowman mesafesinde hidrostatik basınçta artma
- C) Glomerüler plazma onkotik basıncında artma
- D) Renal plazma akımında azalma
- E) Filtrasyon katsayısında artma

8. Aşağıdakilerden hangisi nonketotik hiperosmolar komada görülmez?

- A) Arteryal pH < 7.3
- B) Şuur bulanıklığı ve letarji
- C) Ketonüri
- D) Poliüri
- E) Laktik asidemi

9. Celiac sprue hastalığında karakteristik histopatolojik değişiklikler aşağıdaki intestinal yapıların hangisinde gözlenir?

- A) Brunner bezleri
- B) Lenfatikler
- C) Kapiller damarlar
- D) Kolumnar epitel
- E) Serözal epitel

10. Aşağıdakilerden hangisi hipotiroidide görülen değişikliklerden biri değildir?

- A) Serum kreatin fosfokinaz konsantrasyonunda azalma
- B) Uygunsuz ADH sekresyonu
- C) Serum LDL-kolesterol konsantrasyonunda artma
- D) Prolaktin düzeyinde artma
- E) Demir eksikliği anemisi

11. Aşağıdaki otozomal dominant geçiş gösteren polip sendromlarının hangisinde kanser gelişme-
si riski en düşüktür?

- A) Ailevi kolonik polipozis
- B) Gardner sendromu
- C) Turcot sendromu
- D) Hereditör non-polipozis sendromu
- E) Juvenil polipozis sendromu

12. Altmış sekiz yaşında bir erkek hasta halsizlik ve sol hipokondriumda ağrı şikâyetleriyle başvuruyor. Fizik muayenede dalağın büyüyerek inguinal bölgeye kadar uzandığı saptanıyor. Tam kan sayımında lökosit sayısı $1500/\mu^3$, trombosit sayısı $70\ 000/\mu^3$, hematokrit değeri % 29, hemoglobin miktarı % 8 g olarak bulunuyor.

Bu hastanın ayırıcı tanısında öncelikle aşağıdaki hastalıklardan hangisi düşünölmelidir?

- A) Kronik miyelositer lösemi
- B) Tüylü hücreli (Hairy cell) lösemi
- C) Akut lösemi
- D) Miyelodisplastik sendrom
- E) Hodgkin lenfoma

Diğer sayfaya geçiniz.

13. Ağır hemofili A hastalığında, aşağıdaki laboratuvar testlerinin hangisinde değişiklik gözlenmez?

- A) Protrombin zamanı
- B) Parsiyel tromboplastin zamanı
- C) Aktive parsiyel tromboplastin zamanı
- D) Pıhtılaşma zamanı
- E) Tromboplastin jenerasyon testi

14. Otuz yaşında bir kadın hasta, galaktore ve menstruasyon düzensizliği nedeniyle başvuruyor. Hastanın öyküsünden herhangi bir ilaç kullanmadığı ve bir yıl kadar önce tiroid ameliyatı geçirdiği öğreniliyor. Laboratuvar incelemelerinde serum prolaktin düzeyi 60 µg/L olarak saptanıyor.

Bu hastada tanı için öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

- A) Serum FSH ve LH düzeyleri tayini
- B) Serum TSH düzeyi tayini
- C) Görme alanı muayenesi
- D) Hipofizin magnetik rezonans görüntülenmesi
- E) Serum β-hCG düzeyi tayini

15. Meme akıntısı nedeniyle başvuran 28 yaşında bir kadın hasta, 13 yaşında menarş olduğunu ve bir yıl önceye kadar menstruasyonun düzenli olarak devam ettiğini, son zamanlarda 2 kg kilo aldığını, yorgunluk hissettiğini ancak sıcak basmalarının olmadığını belirtiyor. Öyküsünden daha önce hiçbir hastalığı olmadığı ve ilaç kullanmadığı, aile öyküsünde diabetes mellitus ve erken yaşta koroner arter hastalığı olduğu öğreniliyor. Yapılan fizik muayenede bilateral galaktore dışında patolojik bir bulgu saptanmıyor.

Bu hastanın değerlendirilmesinde ilk yapılması gereken tetkikler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

- A) Medroksiprogesteron uyarı testi
- B) Serum östradiol ve lüteinize edici hormon düzeyleri tayini
- C) Serum prolaktin ve TSH düzeyleri tayini, gebelik testi
- D) Serum progesteron ve lüteinize edici hormon düzeyleri tayini
- E) Serum progesteron ve prolaktin düzeyleri tayini

16. Psikiyatrik tedavi görmekte olan bir hasta poliüri nedeniyle başvuruyor. Laboratuvar incelemelerinde hastanın plazma ozmolalitesi 288 mOsm/kg H₂O, idrar ozmolalitesi 185 mOsm/kg H₂O, serum sodyumu 142 mEq/L, serum potasyumu 4 mg/L olarak saptanıyor. Hastada tetkik amacıyla uygulanan su kısıtlamasından sonra idrar ozmolalitesi 192 mOsm/kg H₂O olarak, 10 mg desmopresin verilmesinden sonra ise idrar ozmolalitesi 199 mOsm/kg H₂O olarak bulunuyor.

Bu hastadaki poliürinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

- A) Lityum tedavisi
- B) Kafa travması
- C) Hipokalemi
- D) Santral diabetes insipidus
- E) Psikojenik polidipsi

17. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi anaerobik bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde etkili değildir?

- A) Penisilin B) Kloramfenikol
C) Metronidazol D) Aminoglikozid türevleri
E) İmipenem

18. Hepsi aynı pastadan yedikten 1-3 saat sonra şiddetli kusma ve sulu, kansız ishal şikâyetleri ortaya çıkan bir grup hasta, acil servise başvuruyor. Fizik incelemelerinde ateş saptanmıyor. Gaitanın Gram boyasıyla hazırlanan yaymasında patolojik bulgu gözlenmiyor.

Bu hastalardaki klinik tabloya aşağıdaki bakterilerden hangisinin neden olma olasılığı en yüksektir?

- A) Enterotoksijenik Escherichia coli
B) Yersinia enterocolitica
C) Clostridium perfringens
D) Salmonella türleri
E) Staphylococcus aureus

19. Aşağıdaki romatizmal hastalıkların hangisinde HLA-B27 nin görülme sıklığı çok yüksektir?

- A) Sistemik skleroz B) Ankilozan spondilit
C) Behçet hastalığı D) Romatoid artrit
E) Sistemik lupus eritematozus

20. Hipertansiyon konusundaki bir tarama çalışmasında, tarama programına alınan 2000 kişinin 400 ünde hipertansiyon saptanmıştır. Muayenede hipertansif olmadığı belirlenenler 1 yıl sonra tekrar muayene edildiğinde, 40 kişide daha hipertansiyon bulunmuştur.

Bu bilgilere göre, 400/2000 oranı aşağıdakilerden hangisini gösterir?

- A) Hipertansiyon prevalansını
B) Tarama testinin duyarlılığını
C) Tarama testinin prediktif değerini
D) Çalışmanın yapıldığı toplumdaki hipertansiyon insidansını
E) Tarama testinin seçiciliğini

21. Önceki (20) numaralı soruda sözü edilen çalışmadaki değerlere göre, 40/1600 oranına ne ad verilir?

- A) Hipertansiyon prevalansı
B) Tarama testinin duyarlılığı
C) Hipertansiyon insidansı
D) Tarama testinin prediktif değeri
E) Tarama testinin seçiciliği

22. Aşağıdakilerden hangisi manik epizod tedavisinde kullanılmaz?

- A) Lityum tuzları
B) Klonidin
C) Valproik asit
D) Fenelzin
E) Karbamazepin

23. Erken başlangıçlı otozomal dominant herediter Alzheimer hastalığında en sık aşağıdakilerin hangisinde mutasyon gözlenir?

- A) Presenilin-2
B) Presenilin-1
C) Tau-protein
D) Apolipoprotein E
E) Beta-amiloid prekürsör protein

24. Tenisçi dirseğinde hassas olan bölge aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Medial kondil
B) Lateral kondil
C) Medial epikondil
D) Trokanter
E) Lateral epikondil

25. Omuz ağrısında öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmemelidir?

- A) Osteoartroz
B) Omuzda rotator kaf tutulumu
C) Tendinit
D) Kapsülit
E) Bursit

26. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde eozinofili, gece kaşınması, vezikülobüllöz polimorfik döküntüler, ürtiker-benzeri plaklar ve biyopside granüler IgA birikimi gözlenir?

- A) Dermatitis herpetiformis
B) İmpetigo herpetiformis
C) Pemfigus vulgaris
D) Keratozis pilaris
E) Parapsöriazis

27. Yirmi dört yaşında sol omuz ağrısı olan bir erkek hastada, direkt radyografide proksimal humerus'ta kistik ekspansiyon ve sabun köpüğü manzarası, kenarlarında çok az reaktif kemik ile normal trabeküllerin olduğu görülmüştür.

Bu hastada öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

- A) Anevrizmal kemik kisti
B) Kondrom
C) Dev hücreli kemik tümörü
D) Osteokondrom
E) Eozinofilik granülom

28. Aşağıdaki durumların hangisinde, çift kontrast kolon grafisi tek kontrast kolon grafisine tercih edilmelidir?

- A) İrritabl kolon sendromu B) Kolona intrinsik bası
C) Familial polipozis D) Divertikülozis
E) Parsiyel kolektomi

29. Kırk dört yaşında bir kadın hasta, yaklaşık 3 yıldır yılda 4 kez ortaya çıkan ve 4-6 saat süren iki taraflı baş ağrısından yakınıyor. Hasta ağrılarının zonklayıcı karakterde ve günlük işlerini aksatacak biçimde olduğunu, ağrıyla birlikte bulantı hissettiğini ancak kusmadığını belirtiyor. Nörolojik muayene bulgularının normal olduğu saptanıyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Küme baş ağrısı B) Migren baş ağrısı
C) Gerilim baş ağrısı D) Tümör baş ağrısı
E) Enfeksiyon baş ağrısı

30. Aşağıdakilerden hangisi sensori-motor polinöropatinin klinik bulgularından biri değildir?

- A) Çevresel tipte duyu bozukluğu
B) Tendon reflekslerinde azalma
C) Ekstremitelerde belirgin olan trofik değişiklikler
D) Spastisite
E) Otonomik disfonksiyon

31. Aşağıdaki bulgulardan hangisi organik fosfat intoksikasyonunda gözlenmez?

- A) Midriyazis B) Bilinç değişimi
C) Hipersalivasyon D) Aşırı terleme
E) Bradikardi

32. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, ORS (Oral rehidratasyon solüsyonu) içerisinde Na ve su absorpsiyonunun en iyi olması için glukoz ve Na oranları kaç olmalıdır?

	Glukoz (g/dL)	Na (mEq/L)
A)	1	50
B)	2	40
C)	2	90
D)	3	25
E)	4	90

33. Vitamin D eksikliğine bağlı olarak gelişen raşitizmde aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisi gözlenmez?

- A) Normal serum kalsiyum düzeyi
- B) Yüksek serum fosfor düzeyi
- C) Yüksek serum alkalen fosfataz düzeyi
- D) Yüksek parathormon düzeyi
- E) Hiperoksalüri

34. Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağı obezitesinin komplikasyonlarından biri değildir?

- A) Kolelitiazis
- B) Psödötümör serebri
- C) Femur başı epifizlerinde kayma
- D) Kan basıncında yükselme
- E) Kan insülin düzeyinde azalma

35. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan bebeklerde hiperinsülinemik hipoglisemiye neden olmaz?

- A) Annenin diyabetik olması
- B) Eritroblastozis fetalis
- C) Beckwith sendromu
- D) Nöroblastom
- E) Nesidioblastozis

36. Yenidoğanın nekrotizan enterokoliti için spesifik olan radyolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Portal venin geç görüntülenmesi
- B) Pnömooperitoneum
- C) Pnömotozis intestinalis
- D) Hava-sıvı seviyesi
- E) Mekonyum ileusu

37. Term ve preterm yenidoğanlarda fulminan seyir gösterebilen ve en sık görülen pnömoni etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Grup B streptokoklar
- B) Klamidya türleri
- C) Sitomegalovirus
- D) Pneumocystis carinii
- E) Staphylococcus aureus

38. Spontan vajinal yolla doğan term bir yenidoğanın doğum sonrası ilk değerlendirilmesinde, spontan solunumunun olduğu, ancak renginin siyanotik ve kalp atım hızının 90/dakika olduğu saptanıyor.

Bu bebeğe aşağıdaki resüsitasyon girişimlerinden hangisi uygulanmalıdır?

- A) Taktil uyaran
- B) Maske ile serbest akışlı oksijen
- C) Kalp masajı
- D) Entübasyon ve ventilasyon
- E) Maske ve balon ile ventilasyon

39. Endokardiyal yastık defektlerinin sıklıkla birlikte görüldüğü kromozom anomalisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Turner sendromu
- B) Klinefelter sendromu
- C) Down sendromu
- D) Trizomi 13
- E) Trizomi 18

40. Aşağıdakilerin hangisinde arilsülfataz A enzim aktivitesinde eksiklik gözlenir?

- A) Krabbe hastalığı
- B) Niemann-Pick hastalığı
- C) Tay-Sachs hastalığı
- D) Metakromatik lökodistrofi
- E) Generalize gangliosidoz

41. Aşağıdaki lipoprotein metabolizma-transport defektlerinden hangisinin genetik geçişi otozomal dominanttır?

- A) Familial hiperkolesterolemi
- B) Lipoprotein lipaz eksikliği
- C) Abetalipoproteinemi
- D) Apoprotein C-II eksikliği
- E) Tangier hastalığı

42. Yoğun bakımda iki gündür metabolik asidoz tanısıyla izlenen yenidoğan bir bebekte aşağıdaki laboratuvar tetkiklerinden hangisi yol gösterici değildir?

- A) Kan-idrar amino asitleri
- B) Amonyak tayini
- C) Kan pH si
- D) İdrar-kan keton ve şeker düzeyleri tayini
- E) Serum ferritin düzeyi

43. Aşağıdakilerden hangisi özel bir patojene karşı hazırlanmış spesifik immünoglobulin preparatlarından biri değildir?

- A) Hepatit B immünoglobulini
- B) Varicella-zoster immünoglobulini
- C) İntravenöz sitomegalovirus immünoglobulini
- D) İnsan immün serum globulini
- E) Kuduz immünoglobulini

44. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi çocukluk çağı akut otitis media hastalığına en sık neden olur?

- A) Solunum sinsityal virusu
- B) Streptococcus pneumoniae
- C) Parainfluenza virusu
- D) Branhamella catarrhalis
- E) Haemophilus influenzae

45. Suçiçeği enfeksiyonunda en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Selülit
- B) Postenfeksiyöz serebellit
- C) Artrit
- D) Ensefalit
- E) Ramsay-Hunt sendromu

46. Çocuklarda HIV enfeksiyonunda erken dönemde aşağıdakilerden hangisi en sık görülür?

- A) Pneumocystis carinii pnömonisi
- B) Lenfoid interstisyel pnömoni
- C) Anemi
- D) Generalize lenfadenopati
- E) Atipik mikobakteriyal pnömoni

47. Kızamık aşısının aşağıdaki durumların hangisinde uygulanması sakıncalıdır?

- A) Annenin gebe olması
- B) Ailede immün sistemi baskılanmış birey olması
- C) İki aydır inhalasyon yoluyla kortikosteroid alınıyor olması
- D) Prematüre doğmuş olma
- E) Lösemi nedeniyle antimetabolit tedavi uygulanıyor olması

48. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan döneminde kolestaz ile birlikte görülmez?

- A) Galaktozemi
- B) α_1 -antitripsin eksikliği
- C) Biliyer atrezi
- D) Wilson hastalığı
- E) Kistik fibrozis

49. Çocukluk çağında obstrüktif uyku apne sendromunun en sık görülen nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Obezite
- B) Down sendromu
- C) Adenotonsiller hipertrofi
- D) Pierre Robin sequensi
- E) Krup sendromu

50. Aşağıdakilerden hangisi, restriktif akciğer hastalıklarının tanısında en değerli solunum fonksiyon testi bulgusudur?

- A) Azalmış total akciğer kapasitesi
- B) Azalmış FEV₁
- C) Artmış rezidüel volüm
- D) Artmış fonksiyonel rezidüel kapasite
- E) Normal vital kapasite

51. Turner sendromunda aşağıdaki doğumsal kalp hastalıklarından hangisi en sık görülür?

- A) Pulmoner atrezi
- B) Ventriküler septal defekt
- C) Atrial septal defekt
- D) Pulmoner darlık
- E) Aort koarktasyonu

52. Klasik vibratuvar üfürüm (Still üfürümü) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) En sık 3-7 yaş arasında görülür.
- B) Sternum orta-sol sınır ve mid-sternal bölgede duyulur.
- C) Valsalva manevrası ile şiddeti artar.
- D) Genellikle 2°-3°/6° şiddetindedir.
- E) Ateş ve egzersiz ile şiddeti artar.

53. Aşağıdakilerden hangisi kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan pozitif inotropik ajanlardan biri değildir?

- A) İzoproterenol
- B) Dopamin
- C) Dobutamin
- D) Digoksin
- E) Propranolol

54. Anemili bir hastada, ortalama eritrosit volümünün ve mutlak retikülosit sayısının düşük olarak saptanması durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmalıdır?

- A) Demir eksikliği anemisi
- B) Megaloblastik anemi
- C) Aplastik anemi
- D) Orak hücreli anemi
- E) Miyelodisplastik sendrom

55. Aşağıdaki testlerden hangisi faktör VII eksikliğinin saptanmasında kullanılır?

- A) Parsiyel tromboplastin zamanı
- B) Protrombin zamanı
- C) Trombin zamanı
- D) Reptilaz zamanı
- E) Öglobulin lizis testi

56. Nöroblastomda, aşağıdaki bulgulardan hangisi iyi prognoz göstergesidir?

- A) Tanı konulduğunda hastanın 1 yaşından küçük olması
- B) N-myc amplifikasyonu
- C) Serumda laktik dehidrogenaz düzeyinin 1500 U/ml nin üzerinde olması
- D) Kemik tutulumu
- E) Primer tümörün sürenal bezden gelişmesi

57. Hipertansiyon, aşağıdaki malign hastalıkların hangisinde en sık görülür?

- A) Wilms tümörü
- B) Abdominal non-Hodgkin lenfoma
- C) Nöroblastom
- D) Feokromositoma
- E) Rabdomiyosarkom

58. Poliartiküler juvenil romatoid artritli bir hastada, non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçlarla birlikte verilebilecek, etkinliği yüksek ve toksisitesi düşük en uygun ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Siklosporin
- B) Metotreksat
- C) Sülfosalazin
- D) Hidroksiklorokin
- E) Azatioprin

59. Yedi yaşında bir kız çocuğunda gonadotropine bağımlı erken puberte saptanması durumunda, etiyolojik neden olarak öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

- A) Hamartom
- B) McCune Albright sendromu
- C) İdyopatik
- D) Hipertiroidi
- E) Hipofiz adenomu

60. Boy kısalığı olan bir çocukta kemik yaşı geriliği yoksa, bu duruma aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu düşünülmelidir?

- A) Parsiyel büyüme hormonu eksikliği
- B) Büyüme hormonu nörosekretuar disfonksiyonu
- C) Boy uzamasındaki yapısal gecikme
- D) Sevgi yoksunluğu kısalığı
- E) Kalıtsal boy kısalığı

61. Cerrahi hastalarında kanamaya neden olan en önemli hematolojik bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Homozigot faktör V Leiden mutasyonu
- B) Antifosfolipid sendromu
- C) von Willebrand hastalığı
- D) Trombositopeni
- E) Hemofili

62. Yara iyileşmesi sırasında yaranın sağlamlığını sağlayan en önemli komponent aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hiyalüronik asit
- B) Elastin
- C) Proteoglikanlar
- D) Fibrin
- E) Kollajen

63. Aşağıdakilerden hangisi hücre dışı sıvı volümü fazlalığında gözlenen bulgulardan biri değildir?

- A) Ortostatik hipotansiyon
- B) Pulmoner ödem
- C) Kalp debisinde artma
- D) Santral venöz basınçta artma
- E) Gallop ritmi

64. Kostik maddeyi yanlışlıkla içen 10 yaşındaki kız çocuğunun tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?

- A) İlk 1 saat içinde nötralizan ajanların kullanılması
- B) Alkali maddelerin nötralizasyonu için yarı sulandırılmış limon veya portakal suyu kullanılması
- C) Asit maddelerinin nötralizasyonu için sodyum bikarbonat kullanılması
- D) Kusturma yapılmaması
- E) Nütrisyon için jejunostomi yapılması

65. Aşağıdaki meme kanseri histopatolojik tiplerinden hangisinin prognozu en iyidir?

- A) İnflamatuvar karsinom
- B) Medüller karsinom
- C) Duktal karsinom
- D) Lobüler karsinom
- E) Papiller karsinom

66. Otuz yaşında bir erkek hastada, tiroidin sol lobunda, ötiroid olan, büyük, sert, soliter bir nodül saptanması durumunda en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Radyoaktif iyot verilmesi
- B) Radyoterapi uygulanması
- C) Cerrahi tedavi
- D) Tiroksin verilmesi
- E) Tiroid stimüle edici hormon supresyonu

67. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası geçiren ve daha önce sağlıklı olan bir hastada hiperglisemi gelişmesine neden olan hormonlardan biri değildir?

- A) Adrenalin
- B) Kortizol
- C) Glukagon
- D) Tiroid hormonu
- E) Katekolaminler

68. Aşağıdaki özofagus atrezisi tiplerinden hangisi en sık görülür?

- A) Fistül olmadan özofagus atrezisi
- B) Özofagus atrezisi + proksimal özofagus + özofagotrakeal fistül
- C) Özofagus atrezisi + distal özofagus + özofagotrakeal fistül
- D) Özofagus atrezisi + hem proksimal hem de distal özofagotrakeal fistül
- E) Özofagus atrezisi olmadan trakeoözofageal fistül

69. Muscularis propria'ya invazyon yapmış olan ve 12 adet bölgesel lenf nodülünde metastaz saptanan bir mide kanseri TNM sınıflamasına göre hangi evrededir?

- A) T1N1
- B) T2N1
- C) T2N2
- D) T3N2
- E) T3N3

70. Karaciğer kist hidatiklerinin en sık görülen komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Süpürasyon (apseleşme)
- B) Safra yollarına rüptür
- C) İntraperitoneal rüptür
- D) Ampiyem
- E) Bronkoplevral fistül

71. Aşağıdakilerden hangisi akut pankreatit nedenleri arasında yer almaz?

- A) Hipotiroidi
- B) Safra taşı
- C) Alkol
- D) Hiperlipidemi
- E) Malnütrisyon

72. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin enfekte pankreatik nekroza yol açma olasılığı en düşüktür?

- A) Escherichia coli
- B) Bacteroides
- C) Chlamydia
- D) Staphylococcus
- E) Candida albicans

73. Aşağıdakilerden hangisi splenektomiden sonra gelişebilecek komplikasyonlardan biri değildir?

- A) Atektazi
- B) Trombositopeni
- C) Subfrenik apse
- D) Sepsis
- E) İntraabdominal kanama

74. Zaman zaman kolik tarzında abdominal ağrısı olan 20 yaşındaki bir hastada çekilen ince bağırsak grafisinde poliplere sekonder intususepsiyon görülmüştür. Yapılan rektoskopik incelemede rektumda da polip bulunan hastanın fizik muayenesinde yüz ve perianal bölgesinde pigmentasyon ve karın bölgesinde hassasiyet saptanmıştır.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Klasik tip ailevi polipozis
- B) Juvenil polipozis sendromu
- C) Gardner sendromu
- D) Turcot sendromu
- E) Peutz-Jeghers sendromu

75. Bağırsağın hem getirici hem de götürücü anslarının aynı anda tıkanması sonucu gelişen mekanik intestinal obstrüksiyon tablosu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kapalı lup obstrüksiyonu
- B) Strangülasyonlu obstrüksiyon
- C) İnkarserasyonlu obstrüksiyon
- D) Paralitik ileus
- E) İnvajinasyon

77. Projektil ve safrasız kusma yakınmasıyla getirilen 3 haftalık bir bebekte, epigastriumda 1 cm çapında mobil kitle palpe edilmiştir.

Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Akalazya
- B) Gastroözofageal reflü
- C) Duodenal atrezi
- D) İleum atrezisi
- E) Hipertrofik pilor stenozu

76. Ameliyat sonrası yara enfeksiyonu gelişiminde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

- A) Yaş
- B) Malnütrisyon
- C) Anemi
- D) Ameliyat öncesi hastanede yatış süresi
- E) Ameliyat süresi

78. Aşağıdakilerden hangisi dejeneratif eklem hastalığının tipik radyolojik bulgularından biri değildir?

- A) Eklem aralığında genişleme
- B) Yük taşıyan bölgelerde skleroz
- C) Subkondral kistler
- D) Osteofitler
- E) Eklemde deformasyon

79. Aşağıdakilerden hangisi otitis medianın intrakranial komplikasyonlarından biri değildir?

- A) Kavernöz sinüs tromboflebiti
- B) Subdural apse
- C) Bezoid apsesi
- D) Menenjit
- E) Beyin apsesi

80. Aşağıdaki keratit tiplerinin hangisinde kornea duyarlılığı kaybolmuştur?

- A) Fliktenüler keratit
- B) Punctue keratit
- C) Marjinal keratit
- D) Nörotropik keratit
- E) Fungal keratit

81. Aşağıdakilerden hangisi, spinal anestezinin potansiyel nörolojik komplikasyonlarından biri değildir?

- A) Meningismus
- B) Paralitik ileus
- C) Cauda equina sendromu
- D) Miyelit
- E) Mesane ve rektal paralizi

82. ESWL yöntemi ile taş kırılmasında en zor kırılan taş aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kalsiyum oksalat dihidrat taşı
- B) Kalsiyum fosfat taşı
- C) Ürik asit taşı
- D) Sistin taşı
- E) Magnezyum amonyum fosfat taşı

83. Servikal travma geçiren bir hastada üst ekstremitelerdeki kuvvet kaybının alt ekstremitelere oranla daha fazla olması durumunda aşağıdakilerden hangisi düşünölmelidir?

- A) Santral kord sendromu
- B) Brown-Sequard sendromu
- C) Ön kord sendromu
- D) Komplet transvers miyelopati
- E) Arka kord sendromu

84. Yapılan bir aort koarktasyonu ameliyatından sonra aşağıdaki komplikasyonlardan hangisi be-
lenmez?

- A) Hemotoraks
- B) Paradoks hipertansiyon
- C) Diyafragma paralizisi
- D) Şilotoraks
- E) Mediastinum amfizemi

85. Gövde ön yüzünün 2/3 ü ile, sağ üst ekstremitenin tamamında üçüncü derece yanık ile getirilen normal yapıdaki bir erişkinde dokuzlar kuralına göre yanık yüzdesi kaçtır?

- A) 9
- B) 13
- C) 17
- D) 21
- E) 25

86. Eksternal os kenarındaki endoservikal kriptlerin tıkanması ile oluşan ve genellikle asemptomatik olan kist aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bartholin kisti
- B) Nabothian kisti
- C) Wolff kanalı kisti
- D) Gardner kanalı kisti
- E) Morgagni kisti

87. Aşağıdakilerden hangisi puerperal enfeksiyonun en sık görülen nedenidir?

- A) Endometrit
- B) Mastit
- C) Pnömoni
- D) Üriner enfeksiyon
- E) Epizyotomi yerinde enfeksiyon

88. Kronik pelvik ağrı nedeniyle başvuran kadınlarda en sık görülen pelvik hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Salpingo-ooforit
- B) Pelvik konjesyon sendromu
- C) Pelvik adezyonlar
- D) Uterin leiomyom
- E) Over tümörleri

89. Aşağıdakilerden hangisi uterosakral ligamentlerde en sık görülür?

- A) Epitelyom
- B) Adenomyom
- C) Hemanjiyom
- D) Kondrom
- E) Endometriozis

90. Kız çocuğunda gecikmiş pubertenin en sık görülen nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gonadal yetmezlik B) Fizyolojik
C) Primer hipotiroidizm D) Hipotalamik yetmezlik
E) Santral sinir sistemi defektleri

91. Aşağıdaki vajinal enfeksiyonların hangisinde, akıntı mikroskopisinde diğerlerinden farklı olarak lökosit artışı gözlenmez?

- A) Bakteriyal vajinozis B) Trikomonas vajiniti
C) Vulvovajinal kandidazis D) İnflamatuvar vajinit
E) Atrofik vajinit

92. Aşağıdakilerden hangisi normal gebelikte gözlenen üriner sistem değişikliklerinden biri değildir?

- A) Böbrek büyüklüğünde artma
B) Glomerüler filtrasyon hızında artma
C) Serum kreatinin ve üre nitrojen değerlerinde artma
D) Renal su tutulumunda artma
E) Renal bikarbonat eşik değerinde azalma

93. Aşağıdakilerden hangisi erken dönem postpartum kanama için risk faktörü değildir?

- A) Uzamış doğum eylemi B) Koryoamnionit
C) Polihidramnios D) Oksitosin indüksiyonu
E) Düşük parite

94. Spontan abortusa en sık neden olan otozomal trizomi tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Trizomi 13 B) Trizomi 16 C) Trizomi 18
D) Trizomi 21 E) Trizomi 22

95. Makadi prezentasyondaki bir bebekte, vajinal yolla doğum sırasında en sık zarar gören organ aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Spinal kord B) Dalak C) Adrenal bezler
D) Beyin E) Karaciğer

96. Bir tümör belirteci olan CA-125 in aşağıdaki kanserlerden hangisinde yüksek bulunması be-
lenmez?

- A) Endometriyum kanseri B) Mesane kanseri
C) Fallop tüp kanseri D) Pankreas kanseri
E) Over kanseri

97. Aşağıdaki over tümörlerinden hangisi germlinal epitel kökenlidir?

- A) Disgerminom B) Fibrom
C) Tekoma D) Endometrioid tümör
E) Koryokarsinom

98. Vulva kanserinde en sık görülen histolojik tip aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Malign melanom B) Bazal hücreli karsinom
C) Sarkom D) Adenokarsinom
E) Epidermoid

99. Kontrasepsiyon amacıyla yapılan tübal ligasyonu takiben aşağıdakilerden hangisinin görülme sıklığında azalma beklenir?

- A) Over kanseri
B) Benign over kistleri
C) Pelvik inflamatuvar hastalık
D) Menoraji
E) Pelvik ağrı

100. Kombine oral kontraseptif hap kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Progestini farklı, düşük östrojenli hapların biyolojik etkileri eşdeğerdir.
B) Adet geciktirmek istendiğinde, ara vermeden yeni kutuya geçilir.
C) Uzun kullanımda, zaman zaman hap kesilip vücut dinlendirilmelidir.
D) Hap alınması iki günden daha uzun süre unutulduğunda, yeni bir kutuya başlanır.
E) Haplara adet ilk 5 gününün herhangi birinde başlanabilir.

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

1. Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu olan saat, hesap makinesi, sözlük, kitap, defter, müsvedde kâğıdı, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri her türlü araç gereçle, silah ve benzeri teçhizatla sınava girmesi kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi **2 saattir (120 dakika)**. Sınavın **ilk yarısında** ve son **15 dakikası** içinde hiçbir adayın sınavdan çıkmasına izin verilmeyecektir. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan edilip cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya kadar yerinizde kalınız.
3. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
4. **Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır.**
5. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya girişiminde bulunulduğunu gösterirse, kopya eylemine katılan adayların cevaplarının bir kısmı veya tamamı geçersiz sayılacaktır. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Bu durum sizin için son derece önemlidir.

Sınav görevlileri, bir salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren adayların tümünün sınavını geçersiz sayabilir.

6. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Cevap kâğıdında ilgili alanları doldurmanız gerekmektedir. Yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
- Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçıklarına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
8. Soru kitapçığının sayfalarının eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçığı türüyle aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığının sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için Salon Başkanına başvurunuz.
9. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçıklarının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, aday numaranızı ve bu salonun salon numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM'de tek tek incelenecektir. Soru kitapçıklarınızın bir tek sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
10. Soru kitapçıklarının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
11. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
12. **Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı, 2010-STSS 2. Aşama Sınav Giriş Belgenizi, salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.**

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
YURT DIŐI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĐİ İÇİN
SEVİYE TESPİT SINAVI

16 MAYIS 2010

TIP DOKTORLUĐU

2. AŐAMA

- | | | | |
|-------|-------|-------|--------|
| 1. A | 26. A | 51. E | 76. C |
| 2. D | 27. C | 52. C | 77. E |
| 3. E | 28. C | 53. E | 78. A |
| 4. E | 29. B | 54. A | 79. C |
| 5. D | 30. D | 55. B | 80. D |
| 6. B | 31. A | 56. A | 81. B |
| 7. E | 32. C | 57. D | 82. D |
| 8. A | 33. B | 58. B | 83. A |
| 9. D | 34. E | 59. C | 84. E |
| 10. A | 35. D | 60. E | 85. D |
| 11. E | 36. C | 61. D | 86. B |
| 12. B | 37. A | 62. E | 87. A |
| 13. A | 38. E | 63. A | 88. C |
| 14. B | 39. C | 64. C | 89. E |
| 15. C | 40. D | 65. E | 90. A |
| 16. A | 41. A | 66. C | 91. C |
| 17. D | 42. E | 67. D | 92. C |
| 18. E | 43. D | 68. C | 93. E |
| 19. B | 44. B | 69. C | 94. B |
| 20. A | 45. A | 70. B | 95. D |
| 21. C | 46. D | 71. A | 96. B |
| 22. D | 47. E | 72. C | 97. D |
| 23. B | 48. D | 73. B | 98. E |
| 24. E | 49. C | 74. E | 99. A |
| 25. A | 50. A | 75. A | 100. C |